



Vaginitis bacteriana

Marga Rodriguez Espejo



Índice

1. Fisiopatología
2. Prevención y tratamiento
3. Abordaje integrativo
4. Surtido en farmacia




Vulvovaginitis bacteriana

Es una infección bacteriana causada por una disbiosis de la propia flora vaginal que cursa sin inflamación.


Aparece cuando disminuye la población de lactobacilos.

Muy frecuente en mujeres en edad fértil.





Vulvovaginitis bacteriana





Vulvovaginitis bacteriana

Factores desencadenantes:


- consumo de antibióticos de amplio espectro,
- Duchas vaginales,
- anticonceptivos orales o inmunosupresores,
- diabetes mal controlada,
- embarazo, fumar
- falta o exceso de limpieza.

Síntomas:


- flujo maloliente
- picor
- secreción vaginal grisácea sin grumos
- disbiosis



↓ LACTOBACILLUS



↑ ANAEROBIOS GRAM NEGATIVOS




DISBIOSIS - INFECCIÓN

Gardnerella vaginalis
Mycoplasma hominis
Oreovotella spp
Bacteroides spp



Puntos clave del abordaje





Recurrencias





VB

*Más de 2 episodios
en el último año*

FASE AGUDA

FASE MANTENIMIENTO

ANTIBIÓTICO

**ÁCIDO LÁCTICO
VAGINAL 7 DÍAS
LACTOBACILLUS
ORAL (MIN 10 DÍAS)**

**OVULOS CLX
TRAS REGLA**

3 MESES

**LACTOBACILLUS
GLUTAMINA+ SI**

**GEL ÍNTIMO ANTISÉPTICO Y REEQUILIBRANTE
ESTILO DE VIDA**



Gracias