Suelo pélvico

Marga Rodriguez Espejo

Disfunción del útero-ovario

- Amenorreas,
dismenorreas.
- Lumbalgias
- Tendinitis
- Trocanteritis
- Síndrome del piramidal

Suelo pélvico

Es un conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis.

Forman parte del *core*, junto con el abdomen, el diafragma, los oblicuos, la musculatura lumbar y el suelo pélvico.

SISTEMA DE SOSTÉN

¿Cómo saber si tengo el suelo pélvico debilitado?

- . Pérdidas de orina.
- . Prolapso o descenso de los órganos pélvicos.
- . Sensación de pesadez en el bajo vientre o en la zona anal.
- . Dificultad para controlar los gases.
- . Dolor durante las relaciones sexuales.
- . Ganas continuas de orinar y/o defecar.

Factores que debilitan el SP

- El embarazo, parto, posparto y menopausia.
- Sedentarismo
- Deporte de impacto
- Tóxicos
- Inflamación crónica
- Estreñimiento
- Incontinencia urinaria
- Salud hormonal
- Endometriosis

Puntos fundamentales a tener en cuenta

1. HORMONAS
2. INTESTINO
3. COLÁGENO

1. Hormonas y suelo pélvico

Cambios postmenopáusicos en la mucosa vaginal

2. Intestino

DISFUNCIÓN DE SUELO PÉLVICO

3. Colágeno

La musculatura pélvica
contiene colágeno tipo I y
tipo III.

Función sostén.

Se pierde con envejecimiento
(estrógenos)

Consecuencias

- Incontinencia urinaria
- Prolapsos
- Dolor lumbar
- Disfunciones sexuales

Fuente: NPunto

Beneficios

- Mujeres que hacen deporte tipo Crossfit, running
- Problemas lumbares
- Prevención cistitis
- Prevención de prolapsos y hemorroides

Vaginismo

Es una alteración que provoca que los músculos de la vagina se contraigan de forma involuntaria, lo que imposibilita mantener relaciones sexuales con penetración.

Vulvodinia

Es un dolor crónico en la vulva.

Puede surgir en cualquier mujer y en cualquier etapa de su vida.

Síntomas:

- ardor
- Sequedad vaginal
- inflamación o sensación de hinchazón vulvar
- dolor anal o rectal, con las relaciones sexuales.

Tratamiento suelo pélvico debilitado

- Ejercicio físico para tonificar core
- Ejercicios de kegel
- Buena alimentación (colágeno)
- Mejorar funcionalidad eje intestino-vagina-hormonas

Ejercicios de Kegel

- Hay dispositivos que nos ayudan: bolas, masajeador, ejercitador
- Con el cuerpo relajado y la vejiga vacía
- Controlar la respiración
- Realizar 10 series de contracción (3-5 s)/relajación (3-5 s), 3 veces al día
- Resultados en 6 semanas.

5 minutos al día

Cómo hacer ejercicios de Kegel

1. Contrae y eleva los músculos de tu suelo pélvico

2. Mantén la contracción

3. Suelta la contracción

4. Descansa y relaja, y repite la rutina

¿Cómo saber si lo hago bien?

- Relajarse
- experimenta con tu cuerpo
- no apretar nalgas ni forzar las lumbares
- Tener paciencia
- visitar a un fisio especializado en suelo pélvico

Ejercicios de core

- Prevenir lesiones

Músculos del Core

CORE EXERCISES

- 1 Plank 30"**
- 2 Rocking plank 30"**
- 3 High plank 30"**
- 4 High plank with shoulder taps 30"**
- 5 Bird dog 30" x 2**
- 6 Bird dog with weight 30" x 2**
- 7 Hip thrust 30" x 2** OPTIONAL
- 8 Commando plank 30"**
- 9 Side plank 30" each side**
- 10 Spiderman plank 30"**
- 11 Slow mountain climbers 30"**
- 12 Side plank rotation 30" each side** OPTIONAL
- 13 Dead bugs 30" x 2**
- 14 Renegade row 30"**

evaluffit

Surtido y abordaje en farmacia

- Material para ejercicios de kegel
- Suplementos a base de colágeno, magnesio, condroitina, etc
- Probióticos
- Ejercicio
- Reducir inflamación y permeabilidad (Curcumina)
- Alimentación (↑estrógenos)

Gracias